

Informacje ogrodnicze i porady na MAJ

SADOWNICTWO.

W maju kończymy cięcie drzew, bezwzględnie usuwamy tak zwane wilki – pionowo rosnące gałęzie na wyciętych w latach poprzednich konarach. Wycinamy uszkodzone i połamane gałęzie o ile tego nie zrobiliśmy wcześniej. Zwracamy szczególną uwagę na ochronę drzew i krzewów owocowych przed szkodnikami i chorobami.

Śliwy - Koniec kwitnienia śliwy to czas, w którym zawiązki są atakowane przez owocnicę żółtorogą. Skuteczne w zwalczaniu szkodnika są wszystkie preparaty owadobójcze a szczególnie Calypso czy Mospilan. Przy oprysku pamiętajmy o ochronie pszczoł i sąsiadów.

Zabieg wykonujemy wieczorem uprzedzając sąsiadów.

Czereśnie - to odrębny temat wszyscy je lubimy a także upodobał je sobie szkodnik o nazwie nasienica trześniówka, który powoduje robaczywienie owoców. Szczególnie atakowane są odmiany średnio późne i późne, dlatego do nasadzeń na działkach zalecane są odmiany wczesne i średnio wczesne (Rivan, Buriat, Bładoróżowa), drzewka na podkładkach wolnorosnących. Coraz częściej spotykamy się z robaczywieniem wiśni.

Z nasienicą można walczyć, ale w warunkach działkowych jest to praktycznie niemożliwe. Po pierwsze trudno uchwycić optymalny czas oprysku, po drugie jak technicznie pokryć preparatem wysokie z natury drzewa czereśni, a po trzecie jak przekonać wszystkich działkowców do wykonania zabiegu żeby uniknąć przenoszenia się owadów z drzewa na drzewo.

Wniosek może być tylko jeden, uprawiamy wczesne odmiany czereśni a jeśli mamy na działce drzewo z „nadziewanymi” owocami najlepiej zastąpić je innym.

Wiśnie - opryskując drzew roztworem Sylitu pod koniec opadania płatków możemy zapobiec drobnej plamistości liści drzew pestkowych, która powoduje przedwczesne opadanie chorych liści i słabe wybarwienie owoców.

Grusze - w maju możemy zapobiegać rdzy grusz chorobie która atakuje liście tworząc na nich pomarańczowo-rdzawe plamy. Grzyb sprawca choroby rozwija się w zimie na jałowcach sabińskich, a w maju atakuje młode liście grusz. Do zwalczenia choroby wystarczą 2 opryski preparatem: Score, Topsin lub Kaptan co 2 tygodnie począwszy od końca kwitnienia gruszy.

Wycinajmy także chore pędy jałowca.

Leszczyna - Owoce tego krzewu atakowane są przez owada słonkowca orzechowca. Brak ochrony powoduje, że z roku na rok % robaczywych owoców szybko wzrasta. Możemy temu zapobiec opryskując krzewy preparatami z grupy pyretroidów: Decis, Fastac lub Calipso od chwili początku żerowania chrząszczy na liściach. Zabieg ten zwalczy także mszyce występujące na liściach. Jeśli w poprzednich latach obserwowaliśmy przedwcześnie opadające brązowiejące zawiązki orzechów, to mamy do czynienia z objawami choroby brunatnej zgnilizny – Moliniozy (atakującej także drzewa pestkowe np. wiśnie), która może zniszczyć nawet 70% orzechów. Silnej infekcji sprzyja temp. pow. 20° C. Do ochrony zalecany jest Sumilex 500 S.C, Sadoplone lub Penncozeb., które zwalczą także szarą pleśń. Pierwszy oprysk należy wykonać w momencie pojawienia się wierzchołka owocu między liśćmi okrywowy owocu.

Winorośl – Przed kwitnieniem należy przystąpić do ochrony wrażliwych odmian przed mączniakiem rzekomym. Stosujemy oprysk roztworem Dithane M45 0,3%, lub Champion 0,3% i mączniakiem prawdziwym Siarkol extra 0,3%, lub Tiowol 0,3% (tj. 3g/1l. wody).

WARZYWA

Siejemy rośliny ciepłolubne: dyniowate, kukurydze cukrową, fasolę szparagową karłową i tyczną oraz fasolę na suche nasiona.

Wysadzamy rozsady warzyw kapustnych, sałaty, pomidorów, papryki, oberżyny. Z uwagi na zmienną i nieprzewidywalną pogodę dobrze byłoby przykryć wysiane i wysadzone warzywa włókniną, która ochroni przed skutkami nagłych zmian pogody, a także przed szkodnikami. Dokarmiamy warzywa uprawiane w gruncie saletrą wapniową w ilości 1,0-1,5 kg/ 100 m² pamiętając, że wysiewamy nawozy na suche rośliny.

Możemy także pokusić się o dokarmianie roślin nawozami rozpuszczalnymi w wodzie.

Działają one bardzo szybko, są wydajne, ale wymagają ścisłego przestrzegania instrukcji stosowania, nawozy te zawierają wszystkie potrzebne do rozwoju makro i mikroelementy.

ROŚLINY OZDOBNE

Koniec kwitnienia wcześniej zakwitających krzewów ozdobnych takich jak forsycja, wierzba „Pendula”, migdałek i jest to odpowiedni czas na formowanie tych krzewów, a przy okazji usuwamy stare pędy i odmładzamy krzewy.

Pamiętajmy o usuwaniu przekwitających kwiatostanów roślin cebulowych, co zapobiega tworzeniu się nasion i poprawia siłę wzrostu, chroni także przed chorobami grzybowymi.

Wysadzamy cebule i bulwy roślin ciepłolubnych zimujących w pomieszczeniach (mieczyki, kanny, kalie, eukomisy, dalie), a także wysadzamy sadzonki roślin wrażliwych na przymrozki (szałwie, begonie).

Systematycznie pielęgnujemy trawnik tj. dokarmiamy saletrą amonową lub wapniową w ilości 5 kg/100m² lub 3 kg/100m² (dawka na cały sezon), kosimy, usuwamy mech,

Życzymy miłego wypoczynku w kontakcie z przyrodą.

Kazimierz Dominiak instruktor ogrodniczy UDZIELAM PORAD I ODPOWIADAM NA
PYTANIA W GODZ. 10-14 ta TEL. 62 75 75 200